

ENTRENAMIENTO PARA LOS EMPLEADOS SOBRE SÍLICE CRISTALINA

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. a

2. c

3. b

4. a

5. b

6. b

7. a

8. b

9. a

10. a

ENTRENAMIENTO PARA LOS EMPLEADOS SOBRE SÍLICE CRISTALINA
CUESTIONARIO DE REVISIÓN

Nombre _____ Fecha _____

Por favor responde las siguientes preguntas para mostrar qué tan bien comprendió la información presentada durante este programa.

1. El polvo de sílice dañino puede ser tan pequeño que no se puede ver a simple vista.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

2. ¿Qué tipo de silicosis ocurre después de muchos años de baja a moderada exposición a polvo de sílice?
 - a. La silicosis aguda
 - b. La silicosis complicada
 - c. La silicosis crónica

3. OSHA ha establecido que el límite permisible de exposición, o "PEL" por sus siglas en inglés, de sílice cristalina sea de ____ microgramos de sílice cristalina respirable por metro cúbico de aire en promedio durante ocho horas de trabajo al día.
 - a. 25 microgramos
 - b. 50 microgramos
 - c. 100 microgramos

4. El estándar de _____ de OSHA requiere específicamente que se asigne una persona competente para implementar el plan de control de exposición.
 - a. Construcción
 - b. La industria en general
 - c. Operaciones marítimas

5. _____ es la colocación de barreras alrededor del área de trabajo para restringir que el polvo de sílice se esparza por el lugar de trabajo.
 - a. Sustitución
 - b. Aislamiento
 - c. La contención de polvo

6. Los controles de prácticas laborales se refieren a las acciones que el empleador puede tomar para reducir la exposición al polvo de sílice.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

7. Debe esforzarse en evitar usar aire comprimido para quitar las acumulaciones de polvo.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

8. Su organización sólo se requiere tener un programa de protección respiratoria por escrito si se lleva a cabo operaciones de arenado u otras tareas de trabajo que requieren respiradores de presión positiva o otros equipos especializados.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

9. Si usa un respirador con filtro como protección contra el polvo de sílice, debe tener un factor de protección asignado de por lo menos _____.
 - a. 10
 - b. 50
 - c. 100

10. Muchas de las enfermedades relacionadas con la inhalación de polvo de sílice no resultan de una repentina exposición.
 - a. Verdadero
 - b. Falso